

24 ('97 滋賀医科大)

【難易度】… 難

A, B, C を三角形の内角とする．このとき，次のことを証明せよ．

(1) $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \leq \frac{1}{2} \left(1 - \sin \frac{C}{2}\right)$

(2) $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \leq \frac{1}{8}$

(3) $\sin A + \sin B + \sin C \geq 4 \sin A \sin B \sin C$

(4) 三角形の外接円と内接円の半径をそれぞれ R, r とすると， $R \geq 2r$ であり，等号は正三角形のときにのみ成り立つ．

【テーマ】：三角不等式の証明

方針

前問の結果を用いて示します． A, B, C は三角形の内角なので， $A + B + C = \pi$ が成り立ちます．

解答

(1) 【証明】

題意より， $A + B + C = \pi$ …… ① が成り立つ．

$$\begin{aligned} (\text{右辺}) - (\text{左辺}) &= \frac{1}{2} \left(1 - \sin \frac{C}{2}\right) - \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \sin \frac{\pi - (A+B)}{2}\right) - \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left\{1 - \cos \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2}\right) - 2 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2}\right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{1 - \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} - \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2}\right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{1 - \cos \left(\frac{A}{2} - \frac{B}{2}\right)\right\} \geq 0 \end{aligned}$$

等号は， $A = B$ のとき成立する．よって，示された．

(証明終)

(2) 【証明】

$\sin \frac{C}{2} > 0$ より，(1) で示した不等式の両辺に $\sin \frac{C}{2} > 0$ をかけて，

$$\begin{aligned} \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} &\leq \frac{1}{2} \sin \frac{C}{2} \left(1 - \sin \frac{C}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \sin \frac{C}{2} - \frac{1}{2} \sin^2 \frac{C}{2} \\ &= -\frac{1}{2} \left(\sin \frac{C}{2} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \\ &\leq \frac{1}{8} \quad (\because 0 < \sin \frac{C}{2} \leq 1) \end{aligned}$$

等号は，(1) の等号成立条件である $A = B$ と $\sin \frac{C}{2} = \frac{1}{2}$ すなわち $C = \frac{\pi}{3}$ を同時に満たす A, B, C すなわち

$$A = B = C = \frac{\pi}{3}$$

のとき成立する．よって，示された．

(証明終)

(3) 【証明】

$$\begin{aligned}
 \sin A + \sin B + \sin C &= \sin\{\pi - (B + C)\} + \sin B + \sin C \\
 &= \sin(B + C) + 2 \sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2} \\
 &= 2 \sin \frac{B+C}{2} \left(\cos \frac{B+C}{2} + \cos \frac{B-C}{2} \right) \\
 &= 2 \sin \frac{\pi - A}{2} \times 2 \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} \\
 &= 4 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}
 \end{aligned}$$

と変形できる。(2) より, $1 \geq 8 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$ であるから,

$$\begin{aligned}
 \sin A + \sin B + \sin C &\geq 32 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} \\
 &= 4 \sin A \sin B \sin C
 \end{aligned}$$

等号は, (2) より, $A = B = C = \frac{\pi}{3}$ のとき, 成立する. よって, 示された.

(証明終)

(4) 【証明】

正弦定理より,

$$AB = 2R \sin C, \quad BC = 2R \sin A, \quad CA = 2R \sin B$$

であるから, 面積を考えて,

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} r (AB + BC + CA)$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2R \sin C \cdot 2R \sin A \cdot \sin B = \frac{1}{2} r \cdot 2R (\sin A + \sin B + \sin C)$$

$$2R^2 \sin A \sin B \sin C = rR (\sin A + \sin B + \sin C)$$

$$2R \sin A \sin B \sin C = r (\sin A + \sin B + \sin C)$$

$$\therefore \frac{2R}{r} = \frac{\sin A + \sin B + \sin C}{\sin A \sin B \sin C} \geq 4 \quad (\because (3))$$

よって, $R \geq 2r$ を得る. 等号は, (3) より $A = B = C = \frac{\pi}{3}$ のとき成立するので, 正三角形のときである.

よって, 示された.

(証明終)

◇

【解説】

A, B, C が三角形の内角であることから, $A + B + C = \pi$ であることを利用することに気付かなければいけません. 三角関数で扱う公式『和積の公式』の利用がポイントとなります. 『和積の公式』は覚えていなくても構いませんが, 加法定理を足したり引いたりすれば導けるので, 自力で導けるようにはしておきましょう.

【和積の公式・積和の公式】

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \\ \sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2} \\ \cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \\ \cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \} \\ \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \} \\ \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \} \\ \sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \} \end{array} \right.$$